



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



หยุดเสี่ยงด้วยคาถา 5ย. ป้องกันพิษสุนัขบ้า

1. **อย่าแหยม** ให้สุนัขโมโห



2. **อย่าเหยียบ** สุนัขให้ตกใจ

3. **อย่าแยก** สัตว์ที่กักกัน
ด้วยมือเปล่า



4. **อย่าหยิบ** แย่งงานอาหาร

5. **อย่ายุ่ง** สุนัขที่ไม่ได้เลี้ยง



โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน

แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ

กัด

ข่วน

เลียบาดแผล



อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหาร เจ็บคอ

มีไข้ อ่อนเพลีย

กลัวลม

กลืนลำบาก กลืนน้ำ

คันรุนแรง

บริเวณที่เคยถูกกัด

อัมพาตตาย

ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

ระยะตื่นเต้น

ระยะอัมพาต

- นิสัยเปลี่ยน ไร้สำนึก
- หงุดหงิด เกินตัว
- หวาดระแวง บ่นตายง่าย

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- ทำหอน

- บำลยโหล
- คางห้อยตก
- ล้มลง ตาย

อย่าแห่

อย่าเหยียบ

อย่าแยก

อย่าหยิบ

อย่ายุ่ง

คาถา
๕ย

กันสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

หาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ



สุนัขที่กัดกันด้วยมือ
เปล่า



อาหารที่สุนัขกำลังกิน



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ



กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เสี่ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค

ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ตาย ๑๐๐%


คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด
หลาย ๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง
มาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด



ลักษณะโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า มีอาการทั้งแบบดุร้ายและซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ



ระยะแรก

มีลักษณะนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

ระยะตื่นเต้น

เริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด อยู่ไม่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก



ระยะอัมพาต

มีอาการค้างห้อย ตก ลิ้นสีแดงคล้ำ ห้อยออกมานอกปาก น้ำลายไหล ขาอ่อนเปลี้ย การทรงตัวไม่ดี อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด



ทำบุญได้บาบ

ให้อาหารแก่สุนัขหรือแมวจรจัด



เพราะอาจทำให้สุนัขหรือแมวจรจัดกัดกัน ทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ และทำให้แพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น เสี่ยงต่อการกัดคนและแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นด้วย



โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน



โรคพิษสุนัขบ้า

"ไม่อยากตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า นำหมาแมวไปฉีดวัคซีน"

"โดนหมา แมว กัด ช่วน เลี้ยว รีบ! ค้างแผล ใส่ยา ชังหมา นานหมอฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด"



โรคพิษสุนัขบ้า

คืออะไร?

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย กระจ่าง ลิง หนู ค้างคาว ฯลฯ



โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อได้อย่างไร?

โรคพิษสุนัขบ้า ติดต่อผ่านทางน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อ โดยการ กัด ข่วน หรือ เลีย ที่แผลสด ลูกหมาลูกแมว ก็แพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้

โรคพิษสุนัขบ้า หากมีอาการแล้ว **ตาย** ทุกสาย

โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้

ด้วยค่าเงิน 5 ย

- ❌ **อย่า แทะ** หรือเล่นกับสุนัขแรงๆ ให้ตกใจ หรือโมโห
- ❌ **อย่า เขี่ย** สุนัขให้ตกใจ
- ❌ **อย่า แยก** สุนัขที่กำลังกัดกัน
- ❌ **อย่า หนี** งานข้าวที่สุนัขหรือแมวกำลังกิน
- ❌ **อย่า รุม** กับสุนัขหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของ

คิดจะเลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติดังนี้

- ✦ นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป ปีแรกฉีด 2 ครั้ง ปีต่อไปฉีดซ้ำทุกปี
- ✦ เลี้ยงในรั้วบ้าน ไม่ปล่อยไปเล่นพ่วนหรือถ่ายในที่สาธารณะ
- ✦ ทำหมัน ไม่ให้มีลูกมากเกินไป
- ✦ ไม่ให้สุนัขและแมวไปปล่อย

คิดจะเลี้ยงน้องแมว น้องหมา ปรึกษาไป **ฉีดวัคซีน**

เมื่อถูก สุนัขหรือ แมว กัด ข่วน เลีย ต้องปฏิบัติดังนี้

รับ! ล้างแผล ให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ล้างให้ลึกถึงกันแผล เช็ดให้แห้ง



ใส่ยา รักษาแผลสด/ แผลกอยอลล์

ขังหมา ไว้ดูอาการ 10 วัน



หาหมอ เพื่อรับ การรักษาที่ถูกต้อง

ฉีดวัคซีนต่อ ให้ครบชุด



หมากัด

ล้างแผล ใส่ยา ขังหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด

ฉีดฟรี!